

JAK KORZYSTAĆ Z PORADNI LECZENIA BORELIOZY?

Jeżeli zauważysz na skórze rumień o średnicy przynajmniej 5 cm z przejaśnieniem w środku, zgłoś się niezwłocznie do lekarza opieki podstawowej. Rozpoznanie rumienia wędrującego jest równoznaczne z rozpoznaniem boreliozy z Lyme i wymaga natychmiastowego rozpoczęcia leczenia antybiotykiem, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek badań dodatkowych.

W razie wątpliwości – skorzystaj z **Telefonicznych Porad Medycznych (tel. 500 900 510)**.



Jeżeli zaobserwujesz u siebie objawy sugerujące boreliozę inne niż rumień, np. objawy grypopodobne z gorączką, bólami głowy, stawów, mięśni i zmęczeniem, dolegliwości stawowe lub neurologiczne – zadzwoń do Telefonicznych Porad Medycznych.

Lekarz zleci wykonanie testu przesiewowego w kierunku boreliozy (badanie przeciwciał IgM i IgG metodą Elisa) i pokieruje dalszym postępowaniem.

Test przesiewowy wykonaj w wybranej placówce. Jeśli badanie wykonujesz w placówce współpracującej, poproś o autoryzację skierowania z systemu Medicover.

Po odebraniu wyniku, skontaktuj się ponownie z Telefonicznymi Poradami Medycznymi. Jeżeli wynik jest dodatni lub wątpliwy, otrzymasz skierowanie do **Poradni Leczenia Boreliozy** na dalszą diagnostykę (test potwierdzenia metodą Western Blot).

Wykonaj test Western Blot w wybranej placówce. Poproś o autoryzację skierowania z systemu Medicover.

Z wynikami obu badań udaj się na konsultację lekarza chorób zakaźnych w **Poradni Leczenia Boreliozy** lub innej wybranej placówce.



PAMIĘTAJ!

Na wizytę zabierz wyniki dotychczas wykonanych badań w kierunku boreliozy oraz historię dotychczasowego leczenia (przyjmowane leki, karty leczenia szpitalnego itp).